



**ΤΑΞΗ:** Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:** ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
**ΜΑΘΗΜΑ:** ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

**Ημερομηνία: Σάββατο 11 Μαΐου 2019**  
**Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες**

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Απόδειξη σχολικού βιβλίου σελίδα 217

**A2. (α)** Ψευδής

**(β)** Για την συνάρτηση  $f(x) = x^4$ , επειδή η  $f'(x) = 4x^3$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$  η  $f(x) = x^4$  είναι κυρτή στο  $\mathbb{R}$ .

Εντούτοις η  $f''(x)$  δεν είναι θετική στο  $\mathbb{R}$  αφού  $f''(0) = 0$

**A3.** Το (γ) είναι το ψευδές συμπέρασμα.

**A4.** (α) Λάθος (β) Σωστό (γ) Σωστό (δ) Σωστό (ε) Λάθος

#### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με

$$f'(x) = \frac{(2x+1)'(x-2) - (2x+1)(x-2)'}{(x-2)^2} = \frac{2(x-2) - (2x+1)}{(x-2)^2} = -\frac{5}{(x-2)^2}$$

Άρα  $f'(x) < 0$  σε κάθε ένα από τα διαστήματα  $A_1 = (-\infty, 2)$ ,  $A_2 = (2, +\infty)$

Επομένως η  $f$  γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα αυτά.

Η  $f$  συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο  $A_1$  άρα το σύνολο τιμών της είναι :

$$f(A_1) = \left( \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right) = (-\infty, 2)$$

διότι:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left( (2x+1) \frac{1}{x-2} \right) = 5 \cdot (-\infty) = -\infty$$

αφού  $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x-2) = 0$  και  $x-2 < 0$  για  $x < 2$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

Η  $f$  συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο  $A_2$  άρα το σύνολο τιμών της είναι:

$$f(A_2) = \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \right) = (2, +\infty) \text{ διότι:}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( (2x+1) \frac{1}{x-2} \right) = 5 \cdot (+\infty) = +\infty$$

αφού  $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) = 0$  και  $x-2 > 0$  για  $x > 2$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

$$\text{Άρα } f(A) = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

**B2.** Επειδή τα σύνολα τιμών είναι ξένα μεταξύ τους άρα η  $f$  είναι 1-1 επομένως αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της  $f^{-1}$  είναι το σύνολο τιμών της  $f$  άρα για κάθε  $x \neq 2$  έχουμε

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{2x+1}{x-2} = y \Leftrightarrow 2x+1 = yx-2y \Leftrightarrow 2x-yx = -1-2y$$

$$\Leftrightarrow x(2-y) = -1-2y \Leftrightarrow x = \frac{2y+1}{y-2}$$

$$\text{Άρα } f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-2}, x \neq 2$$

**Παρατήρηση:** Το ερώτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και χωρίς τη βοήθεια του B1, αποδεικνύοντας ότι η  $f$  είναι 1-1 :  $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \dots x_1 = x_2$  και να βρεθεί ο τύπος της αντίστροφης λύνοντας την εξίσωση  $f(x) = y$  ως προς  $x$  παίρνοντας τους κατάλληλους περιορισμούς για το  $y$ .

$$\mathbf{B3.} \quad f''(x) = \left( \frac{-5}{(x-2)^2} \right)' = \frac{10(x-2)}{(x-2)^4} = \frac{10}{(x-2)^3}$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{10}{(x-2)^3} > 0 \Leftrightarrow (x-2)^3 > 0 \Leftrightarrow x > 2$$


$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{10}{(x-2)^3} < 0 \Leftrightarrow (x-2)^3 < 0 \Leftrightarrow x < 2$$

Στο διάστημα  $(-\infty, 2)$  η  $f$  κοίλη ενώ στο διάστημα  $(2, +\infty)$  η  $f$  κυρτή.

Από το **B1**. έχουμε  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$  επομένως η ευθεία  $x = 2$  είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της  $f$

Από το **B1**. έχουμε  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$  και  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$  άρα η ευθεία  $y = 2$  οριζόντια ασύμπτωτη της  $f$  και στο  $(-\infty)$  και στο  $(+\infty)$

Η γραφική της παράσταση είναι:



**B4.** Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$h(x) = f(x) - 2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{2x+1}{x-2} - 2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{5}{x-2}, x \neq 2$$

Ισχύει  $h(x) > 0$  για κάθε  $x \in [3, 5]$  και είναι συνεχής στο διάστημα αυτό άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$E = \int_3^5 h(x) dx = \int_3^5 \frac{5}{x-2} dx = [5 \ln(x-2)]_3^5 = 5 \ln 3 \text{ τ.μ}$$

### ΘΕΜΑ Γ

**Γ1 (α)** Η  $f(x) = a^{x-1} = \frac{1}{a} a^x$  είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  με

$$f'(x) = \frac{1}{a} a^x \ln a \text{ και } f''(x) = \frac{1}{a} a^x \ln^2 a$$

Προφανώς  $f''(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  άρα η  $f$  κυρτή.

#### A-τρόπος

Έστω  $M(x_0, f(x_0))$  σημείο της  $C_f$ , η εξίσωση της εφαπτομένης στο  $M$  είναι

$$\varepsilon: y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y = f'(x_0)x + f(x_0) - x_0 f'(x_0)$$

Εφόσον η  $y = x$  είναι η εφαπτομένη της  $f$  τότε οι παρακάτω εξισώσεις έχουν μία μόνο λύση λόγω κυρτότητας της  $f$ .

$$f'(x_0) = 1 \text{ και } f(x_0) - x_0 f'(x_0) = 0$$

Δηλαδή:  $f'(x_0) = 1$  (1) και  $f(x_0) = x_0$  (2)

Η εξίσωση (2)  $f(x_0) = x_0 \Leftrightarrow a^{x_0-1} = x_0$ , προφανής ρίζα  $x_0 = 1$  η οποία είναι μοναδική εφόσον η  $f$  κυρτή και η  $y = x$  είναι η εφαπτομένη της.

$$\text{και } f'(x_0) = 1 \Leftrightarrow \ln a = 1 \Leftrightarrow a = e$$

#### B-τρόπος

Η εφαπτομένη της σε κάθε σημείο της θα βρίσκεται κάτω από την γραφική παράσταση της  $f$  με εξαίρεση το σημείο επαφής τους.

Έχουμε  $f(x) \geq x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  και η ισότητα ισχύει μόνο για το σημείο επαφής  $x_0 = 1$

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $\varphi(x) = a^{x-1} - x, x \in \mathbb{R}$  για την οποία ισχύει  $\varphi(x) \geq 0$  για κάθε πραγματικό αριθμό και παρατηρούμε ότι  $\varphi(1) = 0$ , δηλαδή  $\varphi(x) \geq \varphi(1)$

Άρα η  $\varphi$  παρουσιάζει ελάχιστο στη θέση  $x = 1$ , είναι παραγωγίσιμη σε αυτό με  $\varphi'(x) = \frac{1}{a} a^x \ln a - 1$  άρα από θεώρημα Fermat  $\varphi'(1) = 0$ .

$$\text{Δηλαδή: } \frac{1}{a} a^1 \ln a - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln a - 1 = 0 \Leftrightarrow a = e$$

### Γ-τρόπος

Επειδή εφάπτονται υπάρχει σημείο  $(x_0, f(x_0))$  ώστε :

$$\begin{cases} f(x_0) = x_0 \\ f'(x_0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^{x_0-1} = x_0 \\ a^{x_0-1} \ln a = 1 \end{cases} \quad (1) \Leftrightarrow \begin{cases} a^{x_0-1} = x_0 \Leftrightarrow a^{x_0} = ax_0 \\ x_0 \ln a = 1 \Leftrightarrow a^{x_0} = e \Leftrightarrow e \ln a = a \end{cases} \quad (1)$$

Η εξίσωση  $e \ln a = a$  έχει προφανή ρίζα  $a = e$  και επειδή η συνάρτηση  $m(x) = e \ln x - x$  παρουσιάζει στη θέση  $x = e$  μέγιστο το μηδέν η ρίζα είναι μοναδική.

### Αιτιολόγηση

$$m'(x) = \frac{e}{x} - 1 \text{ και}$$

$$m'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} = 1 \Leftrightarrow x = e$$

$$m'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} > 1 \Leftrightarrow x < e$$

$$m'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{e}{x} < 1 \Leftrightarrow x > e$$

Δηλαδή η συνάρτηση  $m(x)$  έχει μέγιστη τιμή την  $m(e) = 0$

(β) Η  $g$  δύο φορές παραγωγίσιμη στο  $(-1, +\infty)$  με  $g'(x) = \frac{1}{x+1}$  και  $g''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0$  άρα η  $g$  κοίλη στο  $(-1, +\infty)$

Η εξίσωση εφαπτομένης της  $g$  στο  $x=0$  είναι:  $y - g(0) = g'(0)(x - 0)$

$$g(0) = \ln 1 = 0, g'(x) = \frac{1}{x+1} \text{ άρα } g'(0) = 1$$

Άρα η εξίσωση εφαπτομένης είναι η  $y = x$

Γ2. Η  $h(x) = e^{x-1} - (x+1)\ln(x+1) + x$  παραγωγίσιμη στο  $A = (-1, +\infty)$  με  $h'(x) = e^{x-1} - \ln(x+1) = f(x) - g(x)$

**A-τρόπος**

Η  $g$  κοίλη επομένως  $g(x) \leq x$  και η ισότητα ισχύει για  $x=0$  άρα  $g(x) \leq x \leq f(x)$  επομένως  $f(x) - g(x) > 0$  δηλαδή η  $h$  γνησίως αύξουσα.

**B-τρόπος**

- Ισχύει  $e^x \geq x+1$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  με την ισότητα να ισχύει για  $x=0$   
άρα  $e^{x-1} \geq x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  με την ισότητα να ισχύει για  $x=1$
- Ισχύει  $\ln x \leq x-1$  για κάθε  $x > 0$  με την ισότητα να ισχύει για  $x=1$   
άρα  $\ln(x+1) \leq x$  για κάθε  $x > -1$  με την ισότητα να ισχύει για  $x=0$

με βάση τα παραπάνω  $\ln(x+1) \leq x \leq e^{x-1}$  για κάθε  $x > -1$

επομένως  $f(x) - g(x) > 0$  δηλαδή η  $h$  γνησίως αύξουσα στο

$$A = (-1, +\infty)$$

Για κάθε  $x > 0$  έχουμε:

$$\begin{aligned}
 e^{e^x} - e(e^x + 1)\ln(e^x + 1) + e^{x+1} &> e^{ex} - e(ex + 1)\ln(ex + 1) + e^2x \\
 \Leftrightarrow e^{e^{x-1}} - (e^x + 1)\ln(e^x + 1) + e^x &> e^{ex-1} - (ex + 1)\ln(ex + 1) + ex \\
 \Leftrightarrow h(e^x) > h(ex) \stackrel{\text{h.γνη.αύξουσα}}{\Leftrightarrow} e^x > ex &\Leftrightarrow e^{x-1} > x \Leftrightarrow f(x) > x \Leftrightarrow x \in (0,1) \cup (1,+\infty)
 \end{aligned}$$

**Γ3.** Η εξίσωση  $x^3 + \int_0^1 x f(t^2) dt = \int_0^{e-1} g(t) dt$  ισοδύναμα γράφεται:

$$x^3 + \int_0^1 x f(t^2) dt = \int_0^{e-1} g(t) dt \Leftrightarrow x^3 + x \int_0^1 f(t^2) dt = \int_0^{e-1} \ln(t+1) dt$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x \int_0^1 f(t^2) dt = 1 \Leftrightarrow x^3 + x \int_0^1 f(t^2) dt - 1 = 0$$

Διότι:

$$\int_0^{e-1} \ln(t+1) dt = \int_0^{e-1} (t+1)' \ln(t+1) dt = [(t+1)\ln(t+1)]_0^{e-1} - \int_0^{e-1} (t+1) \frac{1}{t+1} dt$$

$$= e - [t]_0^{e-1} = e - e + 1 = 1$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $k(x) = x^3 + x \int_0^1 f(t^2) dt - 1$  η οποία είναι συνεχής στο

$[0,1]$  ως πολυωνυμική με  $k(0) = -1 < 0$  και  $k(1) = \int_0^1 f(t^2) dt > 0$

Διότι  $f(x) = e^{x-1} > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  άρα και  $f(x^2) = e^{x^2-1} > 0$  οπότε

$$\int_0^1 f(t^2) dt > 0$$

Επομένως από θεώρημα Bolzano η εξίσωση  $k(x) = 0$  έχει μια τουλάχιστον μια ρίζα στο  $(0,1)$  και λόγω μονοτονίας  $k'(x) = 3x + \int_0^1 f(t^2) dt > 0$  η ρίζα μοναδική.

Γ4.  $\alpha'(t) = 2 \Leftrightarrow \alpha(t) = 2t + c$  και επειδή  $\alpha(0) = 0$  άρα  $\alpha(t) = 2t$

$\beta'(t) = 1 \Leftrightarrow \beta(t) = t + c_1$  και επειδή  $\beta(0) = 3$  άρα  $\beta(t) = t + 3$

Το ζητούμενο εμβαδόν με βάση το σχήμα είναι

$$E = \int_{2t}^{t+3} x dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{2t}^{t+3} = \frac{(t+3)^2}{2} - \frac{(2t)^2}{2} = \frac{-3t^2 + 6t + 9}{2}$$

$$E(t) = \frac{1}{2}(-3t^2 + 6t + 9), t \in [0, 3]$$

Το εμβαδό γίνεται ισό με το μηδέν όταν:

$$E(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-3t^2 + 6t + 9) = 0 \Leftrightarrow t = 3, t \in [0, 3]$$

ή ενναλλακτικά: Το εμβαδόν γίνεται μηδέν όταν  $\alpha(t) = \beta(t) \Leftrightarrow t = 3$

Για να βρούμε το μέγιστο:

$$E'(t) = \frac{1}{2}(-6t + 6), t \in (0, 3)$$

$$E'(t) > 0 \Leftrightarrow -6t + 6 > 0 \Leftrightarrow t < 1, t \in (0, 3)$$

$$E'(t) < 0 \Leftrightarrow -6t + 6 < 0 \Leftrightarrow t > 1, t \in (0, 3)$$

Επομένως τη χρονική στιγμή  $t = 1$  το εμβαδό γίνεται μέγιστό

**Παρατήρηση:** Η συνάρτηση του εμβαδού θα μπορούσε να υπολογιστεί θεωρώντας το σχήμα τραπέζιο με μεγάλη βάση το  $\beta(t)$ , μικρή βάση το  $\alpha(t)$  και ύψος τη διαφορά  $\beta(t) - \alpha(t)$

#### ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η εξίσωση εφαπτομένης της  $f$  στο σημείο  $A(1, f(1))$  είναι:

$$\varepsilon: y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

Η  $f$  παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  άρα και συνεχής επομένως θα είναι συνεχής στο  $x = 1$

$$\text{άρα θα ισχύει: } f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$



Οπότε:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x}{x-1} \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 + \ln x}{1} = 1$$

Εφόσον παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  τότε ισχύει :

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Οπότε:

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{x \ln x}{x-1} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1)^2} \stackrel{DLH}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x + 1 - 1}{2(x-1)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Άρα } \varepsilon : y - 1 = \frac{1}{2}(x - 1) \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}(x + 1)$$

Για  $x < 1$ :

$$f'(x) = e^{x-f(x)} (1 - f'(x)) \Rightarrow f'(x) = f(x)(1 - f'(x))$$

$$\Rightarrow f'(x) = f(x) - f(x)f'(x) \Rightarrow f'(x)(1 + f(x)) = f(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{f(x)}{f(x) + 1} > 0$$

Εφόσον το σύνολο τιμών της  $f$  είναι το  $(0, +\infty)$

$$\text{Για } x > 1 : f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x - 1) - x \ln x}{(x - 1)^2} = \frac{-\ln x + x - 1}{(x - 1)^2} = -\frac{\ln x - x + 1}{(x - 1)^2} > 0$$

Ισχύει  $\ln x \leq x - 1$  για κάθε  $x > 0$  και η ισότητα ισχύει μόνο για  $x = 1$  άρα για

κάθε  $x > 1$  ισχύει :  $\ln x < x - 1 \Leftrightarrow \ln x - x + 1 < 0$

$f'(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  άρα η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $A = \mathbb{R}$ .

**Δ2.** Έστω  $\varphi(x) = 2x \ln x - x^2 + 1$ ,  $x \geq 1$

Η  $\varphi$  παραγωγίσιμη στο  $(1, +\infty)$  με  $\varphi'(x) = 2 \ln x + 2 - 2x = 2(\ln x - x + 1) < 0$  για κάθε  $x > 1$  και επειδή η  $\varphi$  συνεχής στο  $x = 1$  άρα η  $\varphi$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $[1, +\infty)$  άρα για  $x \geq 1 \Rightarrow \varphi(x) \leq 0$ .

$$x > 1: f''(x) = -\frac{\left(\frac{1}{x} - 1\right)(x-1)^2 - 2(x-1)(\ln x - x + 1)}{(x-1)^4} = -\frac{-(x-1)^2 - 2x(\ln x - x + 1)}{(x-1)^3} =$$

$$= -\frac{x^2 - 2x \ln x - 1}{x(x-1)^3} = \frac{-x^2 + 2x \ln x + 1}{x(x-1)^3} = \frac{\varphi(x)}{x(x-1)^3} < 0$$

$$x < 1: f''(x) = \frac{f'(x)(f(x)+1) - f'(x)f(x)}{(f(x)+1)^2} = \frac{f'(x)}{(f(x)+1)^2} > 0$$

Η  $f$  κυρτή στο  $(-\infty, 1]$  και κοίλη στο  $[1, +\infty)$

**Δ3.**  $2019 \in f(A) \Rightarrow$  υπάρχει  $x_0 \in \mathbb{R}: f(x_0) = 2019$  το  $x_0$  είναι μοναδικό διότι η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα.

Άρα αντικαθιστώντας  $x = x_0$  στη σχέση  $0 \leq g(x) \leq (f(x) - 2019)^2$

Προκύπτει:  $g(x_0) = 0$  άρα η γραφική παράσταση της  $g$  τέμνει τον άξονα  $x'x$  στο σημείο  $M(x_0, 0)$ , επίσης  $g(x) \geq g(x_0)$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  άρα στη θέση  $x = x_0$  η  $g$  έχει ελάχιστο οπότε από θεώρημα Fermat:  $g'(x_0) = 0$

Η εξίσωση εφαπτομένης της  $g$  στο σημείο  $M$  είναι η  $y = 0$  άρα ο  $x'x$  εφάπτεται στην  $C_g$

Δ4 Θέτω  $x^2 = t$  επομένως  $2x dx = dt$  άρα

$$\int_0^1 \frac{2tf(t)}{(f(t)+1)^3} dt \stackrel{(*)}{=} \int_0^1 2tf''(t) dt = 2 \left( [tf'(t)]_0^1 - \int_0^1 f'(t) dt \right) =$$
$$= 2(f'(1) - f(1) + f(0)) = 2f(0) - 1$$

$$(*) \quad f'(x) = \frac{f(x)}{f(x)+1}, \text{ άρα : } f''(x) = \frac{f'(x)}{(f(x)+1)^2} = \frac{\frac{f(x)}{f(x)+1}}{(f(x)+1)^2} = \frac{f(x)}{(f(x)+1)^3}$$